



LAXAVIT MICRO ENEMA INJ 3X12ML
KELA PHARMA
0057448 - *Sur le marché*

Indications :

- Constipation rectale ou dyschésie (défécation difficile).

Pharmacologie :

Docusate sodique

- Le sodium docusate possède lui aussi un pouvoir lubrifiant. Il ramollit les fèces et en provoquant une sécrétion aqueuse au niveau de la muqueuse intestinale, il stimule également la défécation.
- De plus, par son activité tensioactive, il diminue la viscosité de la glycérine et, de cette manière l'administration rectale et la dispersion du lavement dans le lumen rectal deviennent plus faciles.

Glycérol

- La glycérine excite la muqueuse intestinale, ce qui, lors de son administration rectale, stimule la défécation.
- Elle possède de plus un pouvoir lubrifiant qui favorise l'évacuation des fèces.

Posologie :

Adultes et des enfants à partir de 12 ans

- Le contenu d'un applicateur.
- Le traitement peut être répété 2 à 3 fois par semaine au maximum.

Enfants de 2 à 12 ans

- La moitié du contenu d'un applicateur.
- Le traitement peut être répété 2 à 3 fois par semaine au maximum.

Mode d'administration

- Humidifier la canule.
- Introduire prudemment et profondément dans le rectum et vider le tube.
- Le patient doit essayer de garder le lavement entre 5 et 15 minutes.

Actions indésirables :

- Aucun effet indésirable fréquent ($>$ ou $=1/100$, $<1/10$) ou très fréquent ($>$ ou $=1/10$)