



DAFLON 500 COMP 60 X 500MG  
SERVIER BENELUX  
1607613 - *Sur le marché*

### Indications :

#### Maladie hémorroïdaire

- Traitement de la crise aiguë de la maladie hémorroïdaire.
- Traitement de fond des manifestations fonctionnelles et objectives de la maladie hémorroïdaire.

#### Maladie veineuse

- Traitement des manifestations de l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle ou organique:
- sensation de pesanteur, douleur, crampes nocturnes, œdème, troubles trophiques.

### Pharmacologie :

- La fraction flavonoïque purifiée, micronisée, exerce une action sur le système vasculaire de retour, au niveau:
  - des veines:
    - elle diminue la distensibilité veineuse et réduit la stase veineuse.
  - de la microcirculation:
    - elle normalise la perméabilité capillaire et renforce la résistance capillaire.
  - lymphatique:
    - elle augmente le débit lymphatique.

### Posologie :

#### Maladie hémorroïdaire

- Crise aiguë:
  - Jours 1 à 4: 6 comprimés par jour.
  - Jours 5 à 7: 4 comprimés par jour.
- Traitement de fond:
  - 2 comprimés par jour.

#### Maladie veineuse

- Posologie usuelle:
  - 2 comprimés par jour, en 1 ou 2 prises.

#### Mode d'administration

- Voie orale.

- Prendre les comprimés au moment des repas.

🚫 Actions indésirables :

Fréquents (> ou =1/100, <1/10)

- Diarrhée, nausées, vomissements, dyspepsie.