



CETIRIZINE EG COMP 50 X 10 MG
EG NV
1736248 - *Sur le marché*

Indications :

- ADULTES ET ENFANTS > OU = 6 ANS
- Traitement des symptômes nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et per annuelles.
- Traitement des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

Pharmacologie :

- La cétirizine, métabolite de l'hydroxyzine, est un antagoniste puissant et sélectif des récepteurs H1 périphériques.
- Des études in vitro de liaison aux récepteurs n'ont pas révélé d'affinité mesurable pour d'autres récepteurs que les récepteurs H1.
- En plus de ces effets anti-H1, la cétirizine a démontré des effets antiallergiques: à une dose de 10 mg une ou deux fois par jour, elle inhibe la phase retardée de recrutement des éosinophiles au niveau de la peau et du tissu conjonctif des sujets atopiques, après tests de provocation allergénique.

Posologie :

Adultes et adolescents > 12 ans

- Posologie recommandée:
- 10 mg (= 1 comprimé), 1 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans

- Posologie recommandée:
- 5 mg (= 1/2 comprimé), 2 fois par jour.
- Une adaptation de la dose est indiquée en cas d'insuffisance rénale.

Mode d'administration

- Avaler les comprimés avec un verre de liquide.
- Les comprimés peuvent être divisés en deux doses égales.

Actions indésirables :

Fréquents (> ou =1/100, <1/10)

- Somnolence.
- Vertiges, céphalées.
- Sécheresse de la bouche, nausée.

- Fatigue.
- Pharyngite.
- Diarrhée (chez l'enfant).
- Rhinite (chez l'enfant).