



CETISANDOZ SANDOZ COMP 50 X 10 MG
SANDOZ
1738947 - Sur le marché

Indications :

- ADULTES ET ENFANTS > OU = 6 ANS
- Traitement des symptômes nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
- Traitement des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

Pharmacologie :

- La cétirizine, métabolite de l'hydroxyzine, est un antagoniste puissant et sélectif des récepteurs H1 périphériques.
- Des études in vitro de liaison aux récepteurs n'ont pas révélé d'affinité mesurable pour d'autres récepteurs que les récepteurs H1.
- En plus de ces effets anti-H1, la cétirizine a démontré des effets antiallergiques: à une dose de 10 mg une ou deux fois par jour, elle inhibe la phase retardée de recrutement des éosinophiles au niveau de la peau et du tissu conjonctif des sujets atopiques, après tests de provocation allergénique.

Posologie :

Adultes et adolescents de plus de 12 ans

- Posologie recommandée:
- 10 mg (= 1 comprimé), 1 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans

- Posologie recommandée:
- 5 mg (= 1/2 comprimé), 2 fois par jour.
- Une adaptation de la dose est indiquée en cas d'insuffisance rénale.

Mode d'administration

- Avaler les comprimés avec une boisson.
- Les comprimés peuvent être divisés en doses égales.

Actions indésirables :

Fréquents (> ou =1/100, <1/10)

- Fatigue.
- Vertiges, céphalées.
- Sécheresse buccale, nausées.
- Somnolence.

- Pharyngite.
- Diarrhée (chez l'enfant).
- Rhinite (chez l'enfant).