



PICOPREP POUDRE SOL BUV 1 X 2 SACH
FERRING
2738409 - *Sur le marché*

Indications :

Lavage intestinal

- préalablement
- aux explorations radiologiques ou endoscopiques;
- à une chirurgie si jugé cliniquement nécessaire.

Pharmacologie :

- L'action combinée des deux substances correspond à un puissant effet de purge associé à une stimulation péristaltique visant à vider l'intestin de son contenu.

Citrate de magnésium

- Il agit comme un laxatif osmotique en retenant l'eau dans le côlon.

Picosulfate de sodium

- Laxatif stimulant agissant localement.
- Après clivage bactérien dans le côlon, Il libère le principe actif laxatif, bis-(p-hydroxyphényl)-pyridyl-2-méthane (BHPM) qui agit en stimulant à la fois la muqueuse du gros intestin et celle du rectum.

Posologie :

Adultes et enfants > 9 ans

- 1 sachet avant 8h00 du matin la veille de l'examen.
- Un deuxième sachet pris 6 à 8 heures plus tard.

Enfants < 9 ans

- 1 à 2 ans: 1/4 sachet le matin, 1/4 sachet l'après-midi.
- 2 à 4 ans: 1/2 sachet le matin, 1/2 sachet l'après-midi.
- 4 à 9 ans: 1 sachet le matin, 1/2 sachet l'après-midi.

Mode d'administration

- Reconstituer le contenu d'un sachet dans un verre d'eau (environ 150 ml).
- Remuer pendant 2-3 minutes.
- La solution obtenue doit être un liquide opaque blanc cassé avec une légère odeur d'orange.

- Boire la solution, éventuellement après l'avoir laissée refroidir.
- Un régime pauvre en résidus est conseillé la veille de l'examen à l'hôpital.
- Pour éviter toute déshydratation pendant le traitement: boire environ 250 ml par heure d'eau ou d'un autre liquide clair tant que l'effet laxatif persiste.

 Actions indésirables :

Fréquents (> ou =1/100, <1/10)

- Maux de tête.
- Nausées et proctalgie (douleur rectale).