



DAFLON 500 COMP 120 X 500MG
SERVIER BENELUX
3080314 - *Sur le marché*

Indications :

Maladie hémorroïdaire

- Traitement de la crise aiguë de la maladie hémorroïdaire.
- Traitement de fond des manifestations fonctionnelles et objectives de la maladie hémorroïdaire.

Maladie veineuse

- Traitement des manifestations de l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle ou organique:
- sensation de pesanteur, douleur, crampes nocturnes, odème, troubles trophiques.

Pharmacologie :

- La fraction flavonoïque purifiée, micronisée, exerce une action sur le système vasculaire de retour, au niveau:
- des veines:
- elle diminue la distensibilité veineuse et réduit la stase veineuse.
- de la microcirculation:
- elle normalise la perméabilité capillaire et renforce la résistance capillaire.
- lymphatique:
- elle augmente le débit lymphatique.

Posologie :

Maladie hémorroïdaire

- Crise aiguë:
- Jours 1 à 4: 6 comprimés par jour.
- Jours 5 à 7: 4 comprimés par jour.
- Traitement de fond:
- 2 comprimés par jour.

Maladie veineuse

- Posologie usuelle:
- 2 comprimés par jour, en 1 ou 2 prises.

Mode d'administration

- Voie orale.

- Prendre les comprimés au moment des repas.

Actions indésirables :

Fréquents ($>$ ou $=1/100$, $<1/10$)

- Diarrhée, nausées, vomissements, dyspepsie.