



ALGOSTASE MONO 1 G POT COMP 90 X 1 G  
SMB LABORATOIRE  
3096872 - Sur le marché

### Indications :

- Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.

### Pharmacologie :

- Le paracétamol possède des propriétés antipyrétiques et analgésiques vis-à-vis des douleurs d'intensité moyenne. Il est sans action sur les douleurs de type spasmodique et n'entraîne aucun effet sédatif ni psychodysléptique.
- L'activité analgésique du paracétamol serait due à une inhibition centrale de la synthèse des prostaglandines ou d'autres médiateurs de la douleur.
- Son action antipyrétique s'expliquerait par une inhibition de la synthèse des prostaglandines au niveau du centre thermorégulateur hypothalamique, engendrant ainsi une vasodilatation périphérique et une déperdition cutanée de chaleur.

### Posologie :

Adultes et adolescents > 50 kg

- Posologie usuelle: 500 mg à 1 g, toutes les 4 à 6 heures, jusqu'à 3 g par jour en fonction des besoins.
- Min. 4 heures entre 2 administrations.
- Doses maximales:
- 1 g par prise, et
- 3 g par jour (4 g par jour en cas de douleurs plus intenses ou de fièvre).
- REMARQUES
- Pour les adultes < 50 kg:
- Dose maximale: 60 mg/kg par jour.
- En cas de douleurs de l'arthrose (gonarthrose, coxarthrose):
- 4 g par jour (1 comprimé 4 fois par jour) en 1<sup>ère</sup> intention, en respectant un intervalle de 4 heures entre les prises.

Enfants et adolescents à partir de 12 ans < 50 kg

- Posologie usuelle: 15 mg/kg par dose, max. 4 fois par jour.
- Min. 4 heures entre 2 administrations.
- Doses maximales:
- 15 mg/kg par prise.
- 60 mg/kg par jour.
- Une adaptation de la dose est indiquée en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère, d'insuffisance hépatique, de syndrome de Gilbert et d'alcoolisme chronique.

Mode d'administration

- Avaler les comprimés avec un peu d'eau.
- Les comprimés peuvent être divisés en deux demi-doses égales.
- Durée du traitement: la plus courte possible et limitée à la période symptomatique.
- Consulter un médecin si aucune amélioration après 3 jours ou si aggravation.

 Actions indésirables :

- Aucun effet indésirable fréquent ( $> \text{ ou } = 1/100, < 1/10$ ) ou très fréquent ( $> \text{ ou } = 1/10$ ).